

Novulan®

ACETOFENIDO DE
DIHIDROXIPROGESTERONA
ENANTATO DE ESTRADIOL

**ANTICONCEPTIVO - ANOVULATORIO
SOLUCION INYECTABLE - V.A.: I.M.**

FORMULA

Cada ampolla de 1 mL contiene:

Acetofenido de Dihidroxioprogesterona.....	150 mg
Enantato de Estradiol.....	10 mg
Benzoato de Bencilo.....	c.s.p.
Alcohol Bencilico.....	c.s.p.

ACCION TERAPEUTICA

Anticonceptivo - Anovulatorio - Regulador del ciclo menstrual.

PROPIEDADES

Novulan es una combinación estrógeno - progestágeno para uso como anovulatorio y regulador del ciclo menstrual. Su acción perdura por cuatro semanas, fijándose el compuesto al tejido adiposo, de donde se libera gradualmente para obtener sus beneficios farmacológicos, distribuyéndose por la circulación unido a las proteínas plasmáticas, llegando a todos los tejidos.

INDICACIONES

Irregularidades del ciclo menstrual, dismenorrea, endometriosis, mastodinia, tensión premenstrual, esterilidad endocrina, metrorragia funcional y en toda afección en la que el médico considere útil la producción de ciclos anovulatorios.

CONTRAINDICACIONES

NOVULAN, está contraindicado en pacientes con carcinoma mamario y cérvico uterino, así como embarazo y lactancia. También en pacientes con trastornos de la función hepática. Trastornos tromboembólicos, anemia falciforme, tumores, hormonas dependientes de útero o mama. Trastornos del metabolismo graso. Sangrado vaginal no diagnosticado, aborto, embarazo, antecedentes de embarazo ectópico. Actinomicosis genital.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Hemorragia uterina ocasional, malestar gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No administrar conjuntamente con Inductores de las enzimas hepáticas: Barbitúricos, Meprobamato, Fenilbutazona, Rifampicina, Carbamacepina, pueden disminuir la actividad de los estrógenos.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El Acetofenido de Dihidroxioprogesterona, transforma el endometrio proliferativo en secretor, inhibe la liberación de gonadotropinas hipofisarias y previene con ello la maduración folicular y la ovulación. También inhibe la contractilidad uterina.

Su metabolismo es hepático y su excreción es por la bilis, orina y las heces.

El Enantato de Estradiol, aumenta la síntesis celular de cromatina (DNA), de RNA y de diversas proteínas en los tejidos sensibles. Disminuye la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo. Las proteínas receptoras específicas de los tejidos forman complejos con los estrógenos en los tejidos sensibles a estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En algunas mujeres NOVULAN puede modificar ligeramente la duración de los ciclos menstruales. También puede presentarse goteo intermenstrual.

Se debe consultar a su médico en caso de presentarse; Jaquecas, cefaleas de intensidad no habitual.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Novulan debe ser aplicado en una sola dosis mensual por vía intramuscular profunda entre el 7º y 10º día del inicio del ciclo menstrual.

Se debe considerar como primer día del ciclo menstrual, aquel en el cual se inicia el sangrado.

RESTRICCIONES DE USO

No se debe administrar durante el embarazo, ni en la lactancia.

No debe emplearse si hay sospecha de embarazo.

SOBREDOSIS

Son en general drogas pocos tóxicos y aún administrado en dosis elevadas se toleran bien. No obstante, algunas veces puede producir: anorexia, náuseas, vómitos, cefaleas y mareos.

Estos síntomas desaparecen al disminuir la dosis o suprimir el tratamiento.

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 ampolla x 1 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 00828-04-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya

Importado para Bolivia:

KAIS - Tel.: 3412036

R.F. Dra. Roxana Ribera. MP. R-438

Reg. San.



Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay